

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE LA NUTRICIÓN ENTERAL



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



ACREDITACIÓN
EN SALUD



ISO 9001

icontec
internacional

SC-CER448531



ISO 14001

icontec
internacional

SA-CER448535



OHSAS
18001


icontec
internacional

OS-CER448536



Juntos
por la excelencia

CUIDADOS DEL ESTOMA



- ✓ Lavarse las manos y limpiar la parte de la piel que rodea el estoma con agua caliente y jabón sin olor.
- ✓ Durante los primeros 15 días, lavar la estoma con agua tibia y jabón.
- ✓ Secar meticulosamente el estoma y aplicar una solución antiséptica con una torunda o gasa.
- ✓ Cubrir el área con una gasa estéril, asegurando con esparadrapo antialérgico, permitiendo la circulación de aire.
- ✓ El soporte externo de la sonda puede levantarse y girarse ligeramente, de forma suave.
- ✓ Limpiar diariamente la parte externa de la sonda, de dentro hacia fuera, de forma suave con agua y jabón.
- ✓ Una vez al día debe girarse la sonda para evitar adherencias.



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536



TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE LA NUTRICIÓN ENTERAL

- Colocar al paciente en posición sentada o semisentada y mantenerlo en esta posición al menos hora y media o dos horas tras la administración.
- Lavado de manos previa a la manipulación del preparado de nutrición enteral.
- Lavar boca y dientes del paciente, aunque no coma, al menos dos veces al día.
- Mantener limpios los orificios de la nariz del paciente.



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



ACREDITACIÓN
EN SALUD



ISO 9001

icontec
internacional

SC-CER448531



ISO 14001

icontec
internacional

SA-CER448535



OHSAS
18001

icontec
internacional

OS-CER448536



Juntos
por la excelencia

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE LA NUTRICIÓN ENTERAL



- El tiempo de administración de cada toma debe ser superior a los 15 minutos (cada jeringa de 50 ml, debe administrarse en 2 minutos).
- Después de cada toma se debe lavar la sonda administrando 50 ml de agua tibia.
- Lavar cuidadosamente la jeringa de administración después de cada toma.
- El preparado de nutrición enteral, o preparación casera se debe medir en vaso dosificador o taza que equivale a 200 cc, los complementos una vez preparado, se puede guardarse en la nevera o frigorífico no más de 24 horas.



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



SC-CER448531



SA-CER448535




OS-CER448536



TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE LA NUTRICIÓN ENTERAL

- Administrar el preparado de nutrición enteral a temperatura ambiente.
- Si el paciente tiene sed a pesar del agua administrada en cada toma según las indicaciones de la Nutricionista, se puede dar agua entre tomas.
- Aparte del preparado de nutrición enteral indicado por la Nutricionista y el agua, no administre otros alimentos o medicamentos por la sonda.
- El preparado o complemento para nutrición enteral, administrado en la cantidad indicada, cubre todas las necesidades nutricionales del paciente.



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536



Juntos
por la excelencia